

Fiorda MAX MD ulga w bólu gardła 30 pastylek do ssania

Cena: 17,22 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 30 pastyl. (2x15) |
| Postać | pastyl.do ssania |
| Producent | PHYTOPHARM KLĘKA S.A. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Fiorda MAX MD ulga w bólu gardła 30 pastylek do ssania

Phytopharm

Fiorda® MAX MD jest wyrobem medycznym do stosowania w celu łagodzenia bólu i podrażnienia gardła, wywołanego przez czynniki infekcyjne (wirusy, bakterie) i fizyczne (alergeny, cząstki pyłów, kurz) oraz wspomagająco w przypadku leczenia stanu zapalnego jamy ustnej, gardła i krtani, w przebiegu infekcji bakteryjnych i wirusowych. Wyrób medyczny Fiorda® MAX MD wspomaga, na drodze fizycznej, przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej.

Składniki – Fiorda MAX MD o smaku eukaliptusowo-miętowo-lawendowo-cytrynowym: Jedna pastylka zawiera: wyciąg wodny z porostu islandzkiego, wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, guma arabska, syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, woda, olejek z trawy cytrynowej, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, olejek lawendowy, wosk carnauba, sukraloza.

Sposób użycia: Dorośli i dzieci powyżej 6. r. ż.: zaleca się ssać powoli 1 pastylkę, zależnie od potrzeb kilka razy na dobę. Pastylek nie należy połykać ani rozgryzać. Pastylki nie powinny być stosowane w ciągu pół godziny przed lub po zażyciu leków. Wyrób medyczny Fiorda MAX MD może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia: Ze względu na zawarte w wyrobie substancje słodzące: sorbitol i maltitol, istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowych i biegunki.

Ze względu na obecność olejków eterycznych istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej.

Osoby, u których wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinny przed zażyciem wyrobu skontaktować się z lekarzem.

W związku z tym, że wyrób zawiera substancje śluzowe, wchłanianie równocześnie podawanych leków może być opóźnione. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę między zastosowaniem wyrobu a przyjmowaniem leków.

Wyrób medyczny powinien być stosowany przez dzieci potrafiące ssać, pod nadzorem osoby dorosłej. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia ze względu na ryzyko zakrztuszenia się.