

# Gynauxil 10 globulek dopochwowych



Cena: 27,99 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopochw.
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Gynauxil 10 globulek dopochwowych

Globulki dopochwowe Gynauxil to wyrób medyczny, który zawiera składniki, umożliwiające selektywne namnażanie bakterii *Lactocacillus Vaginalis*. Bakterie te stanowią jedyną florę bakteryjną pochwy, które w wyniku metabolizmu węglowodanów produkują kwas mlekowy oraz zakwaszają środowisko pochwy. Stosowanie globulek Gynauxil pozwala przywrócić lub utrzymać pH pochwy na prawidłowym poziomie, co przyczynia się do zmniejszenia rozwoju bakterii oraz ryzyka powstawania grzybic.

Globulki Gynauxil mogą być stosowane przez kobiety w każdym wieku. Pomagają łagodzić objawy suchości pochwy oraz wzmacniają jej naturalną florę bakteryjną np. po antybiotykoterapii, po menstruacji, w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy.

Po założeniu do pochwy i stopnieniu w temperaturze ciała globulka Gynauxil ulega przekształceniu w mukoadhezyjną emulsję wiążącą się z błoną śluzową. Kwas hialuronowy posiada właściwości regenerujące nabłonek, utrzymujące wilgoć, pobudzające procesy naprawy i odnowy tkanek. Ekstrakt drożdżowy to źródło witamin z grupy B oraz aminokwasów i nukleotydów, wraz z elektrolitem wodnej fazy emulsji sprzyja selektywnemu namnażaniu pałeczek rodzaju *Lactobacillus*.

### Zastosowanie

Przywrócenie lub utrzymanie właściwego pH co stwarza warunki do hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych.  
Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów.

### Sposób użycia

Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Kobiety miesiączkujące/w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza. Należy zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie

należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

#### Składniki

Glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylogowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

#### Ważne wskazówki

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia.  
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Producent  
Polski Lek S.A.  
ul. Chopina 10  
34-100 Wadowice.