


Honikan Kaszel JUNIOR syrop na kaszel suchy i mokry 230 g



Cena: 23,66 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	230 g
Postać	syrop
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Honikan Kaszel JUNIOR syrop na kaszel suchy i mokry 230 g

Honikan Kaszel Junior syrop na kaszel suchy i mokry to wyrób medyczny na bazie miodu i innowacyjnego naturalnego kompleksu Polisedox z babki lancetowatej, prawoślazu i malwy, bogatego w polisacharydy, o działaniu powlekającym i łagodzącym na górne drogi oddechowe. Produkt przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 3 lat.

Zawartość opakowania: Miód akacyjny; kompleks Polisedox na bazie ekstraktów z Babki lancetowatej, Prawoślazu i Malwy bogatych w polisacharydy (masa cząsteczkowa >20.000 Dalton) > 30%; Kocanka; Grindelia; Propolis ZAWIERA TAKŻE: Wodę, Fruktozę, Sok truskawkowy, Gumę ksantanowa, Kwas cytrynowy, Aromat brzoskwiniowy i truskawkowy.

Przeznaczenie produktu: Syrop do stosowania w leczeniu zarówno suchego, jak i produktywnego kaszlu u dzieci w wieku od 3 lat.

Charakterystyka produktu: Regulujące wydzielanie śluzu: sprzyja nawodnieniu flegmy przez co ułatwia jej odkrztuszenie.

Sposób użycia wyrobu medycznego: Dzieci w wieku 3 – 6 lat: 5 ml dwa do czterech razy dziennie, używając dołączonej miarki; Dzieci powyżej 6 lat: 10 ml dwa do czterech razy dziennie, używając dołączonej miarki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na jeden lub więcej składników. W przypadku nietolerancji lub wystąpienia innych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W okresie ciąży i karmienia piersią skonsultować się z lekarzem. Porozmawiaj z lekarzem przed zastosowaniem tego syropu, jeśli stwierdzono u Ciebie nietolerancję niektórych cukrów. Syrop zawiera fruktozę, w dużych dawkach może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Należy to wziąć pod uwagę u osób z cukrzycą lub stosujących dietę niskokaloryczną. W przypadku utrzymywania się kaszlu i podrażnienia dłużej niż 5-7 dni należy skonsultować się z lekarzem, nie stosować w długotrwałych kuracjach.