

Infectvagin, globulki dopochwowe na infekcje pochwy, 10 sztuk

Cena: 31,50 pln



Opis słownikowy

Producent VERCO

Opis produktu

Infectvagin, globulki dopochwowe na infekcje pochwy, 10 sztuk

Infectvagin to wyrób medyczny do leczenia pomocniczego w chorobach zapalnych pochwy różnej etiologii w tym bakteryjnych, grzybiczych i mieszanych, atrofii i dystrofii pochwy oraz zapalenia szyjki macicy, ektopii szyjki macicy (nadżerki). Globulki ze względu na właściwości wiązania cząsteczek wody zalecane są po leczeniu metodami fizycznymi (elektrokoagulacja, laseroterapia, krioterapia) lub w przypadku występowania suchości pochwy w okresie pomenopauzalnym, również przy występowaniu krwawień. Dzięki zawartości w składzie kolagenu i skrzypu polnego globulki sprzyjają procesom gojenia i odbudowy nabłonka. Kwas mlekowy oraz PHMB przywracają fizjologiczne pH, przy czym zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zastosowanie

Pomocniczo przy leczeniu chorób zapalnych pochwy różnej etiologii:

bakteryjnych,
grzybiczych,
mieszanych,
atrofii i dystrofii pochwy,
zapalenia szyjki macicy,
ektopii szyjki macicy (nadżerki).

Sposób użycia

Przed użyciem jak i po dokładnie umyj ręce.
Wymij globulkę z blistra, oddziel dwa końce opakowania i wyciągnij globulkę.
Zaaplikuj globulkę głęboko do pochwy.

Aplikuj wieczorem przed snem.

Składniki

Jedna globulka zawiera:

hydrolizat kolagenu glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB), kwas mlekowy, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W czasie ciąży i karmienia piersią należy najpierw skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na poliheksametylen biguanidu.

Ważne wskazówki

Nie stosować produktu po upływie daty ważności.

Produkt przechowywać z dala od źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 25°C.

Po użyciu opakowanie odpowiednio zutylizować.

Produkt do stosowania dopochwowo.

Ostrzeżenia

Wszystkie czynności przeprowadzaj ostrożnie, a by nie uszkodzić globulki.

Globulki o nadmiernie miękkiej konsystencji, wynikającej z ekspozycji na ciepło nie tracą swoich właściwości. W celu przywrócenia lepszej konsystencji można globulki wsadzić do lodówki.

W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB) jest uznawany za rzadki alergen, ze wskaźnikiem uwrażliwienia równym 0,5% w populacji niewyselekcjonowanej.

Jeśli wystąpią reakcje wskazujące na alergiczne zapalenie skóry, należy przerwać stosowanie globulek i skonsultować się z lekarzem.

Producent

PRAEVENIO Pharma s.r.l.

Via Paolo Rivero, 172/174 - 81031 Aversa (CE), Włochy

Dystrybutor

VERCO S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa