

# Jasnum Comfort 10 globulek dopochwowych



Cena: 37,30 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopoch.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Jasnum Comfort 10 globulek dopochwowych

Globulki Jasnum comfort są przeznaczone dla kobiet w celu łagodzenia dyskomfortu, uczucia suchości oraz napięcia, świądu i pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków płciowych lub badań ginekologicznych.

nawilża, chroni i przywraca elastyczność błony śluzowej pochwy,  
przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej,  
redukuje nieprzyjemny zapach

### SKŁAD

1 globulka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu (Witamina E), mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

### DZIAŁANIE

Po aplikacji Jasnum comfort dopochwowo, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Sól sodowa kwasu hialuronowego i octan tokoferylu (witamina E) obecne w produkcie zabezpieczają i nawilżają błonę śluzową pochwy. Kwas Mlekowy Zastosowany w wyrobie medycznym Jasnum comfort kwas mlekowy wspomaga zachowanie właściwego pH pochwy na poziomie <4,5 (odczyn kwaśny), co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej.

### DAWKOWANIE

W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do

momentu stwardnienia globulki.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!

Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.

Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.

Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.

Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.

Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować w czasie menstruacji.

Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.

Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.

#### Producent

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 8

32-064 Niegoszowice

#### Dystrybutor

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa