

Jonolit BABY, elektrolity dla niemowląt i dzieci 10 saszetek

Cena: 9,77 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz.
Producent	OLEOFARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Jonolit BABY, elektrolity dla niemowląt i dzieci 10 saszetek

Oleofarm

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów.

Dla niemowląt od 1. dnia życia oraz dzieci do 3. roku życia.

Jonolit baby jest preparatem w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach.

Dawkowanie:

Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF:

Faza nawadniania

(pierwsze 4 godziny nawadniania)

Faza nawadniania podtrzymującego

(dalsze etapy nawadniania)

Masa ciała poniżej 5 kg (wiek poniżej 4 miesięcy) zawartość 1 – 2 saszetek rozpuścić w 200 – 400 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 50-100ml (5-10 ml na kg masy ciała) płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 500ml dziennie Masa ciała 5 – 7,9 kg (wiek 4 – 11 miesięcy) zawartość 2 – 3 saszetek rozpuścić w 400 – 600 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml

wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 50-100ml (5-10 ml na kg masy ciała) płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 500ml dziennie Masa ciała 8 – 10,9 kg (wiek 12 – 23 miesięcy zawartość 3 – 4 saszetek rozpuścić w 600 – 800 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 -200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 1000ml dziennie masa ciała 11-15,9 kg (wiek: 2-3 lata) zawartość 4 – 6 saszetek rozpuścić w 800 – 1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 -200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 1000ml dziennie Przeciwwskazania:

wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Ważna informacja:

produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Preparat może stanowić zagrożenie gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt jest żywnością niekompletną. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony jest dla niemowląt od 1. dnia życia oraz dzieci do 3. roku życia.

Składniki:

glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.

Wartość odżywcza 100 g produktu w saszetkach 200 ml produktu sporządzonego zgodnie z instrukcją przygotowania wartość energetyczna 1064 kJ / 304 kcal 48 kJ / 14 kcal tłuszcz, w tym: 0 g 0 g kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g węglowodany, w tym: 76 g 3,4 g cukry 73 g 3,2 g białko 0 g 0 g sól, z czego 14 g 0,6 g sód 6273 mg 276 mg

200ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,24 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg potasu. Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l/

Sposób użycia:

Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Roztwór powinien być podawany niemowlętom oraz dzieciom za pomocą czystej łyżeczki lub kubeczka. Niemowlętom oraz dzieciom do 2. roku życia wlewać roztwór małymi porcjami bezpośrednio do ust co 1-2 minut, starsze dzieci mogą popijać małymi łykami bezpośrednio z kubeczka. W przypadku wystąpienia wymiotów u dziecka, nawadnianie należy przerwać na 5–10 minut, a następnie rozpocząć podawanie płynu w wolniejszym tempie. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Masa netto:

44g (10 saszetek po 4,4 g)

Sposób przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Jonolit baby elektrolity 10 sasz. odwodnienie