


XENNA FAST MIKROWLEWKI 6x10g na ZAPARCIA WYPRÓŻNIANIE



Cena: 31,55 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 mikrowl.
Postać	mikrowlew.doodbyt., roztw.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

XENNA FAST MIKROWLEWKI 6x10g na ZAPARCIA WYPRÓŻNIANIE

Xenna Fast stosuje się na zaparcia. Xenna Fast zmniejsza dyskomfort i przeciwdziała podrażnieniom spowodowanym zaparciem. Xenna Fast przyciąga wodę do stolca, przez co zmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnienie.

W składzie Xenna Fast znajdziemy kompleks Propolax, w skład którego wchodzi monosacharydy, polisacharydy i melanoidyny, pochodzące ze specjalistycznie przetworzonych białych winogron.

Propolax zawarty w Xenna Fast został dodatkowo wzbogacony o frakcje polisacharydowe z aloesu, prawoślazu i malwy. Mają one działanie nawilżające i zmiękczające. Do tego wykazują działanie śluzopodobne, dzięki czemu masy kałowe łatwiej przechodzą.

W Propolaxie znajdują się także alkohole wielowodorotlenowe i węglowodany, które dzięki osmotycznym właściwościom sprawiają, że wypróżnianie jest łatwiejsze.

Propolis hydroglicerynowy, który zawiera Xenna Fast chroni śródbłonek błony śluzowej odbytnicy, dzięki czemu wypróżnianie może być mniej bolesne.

Wskazania:

Wyrób medyczny Xenna Fast jest środkiem przeczyszczającym powstałym na bazie ekstraktów naturalnych oraz składników cukrowych, które wykazują działanie ochronne i łagodzące błonę śluzową odbytnicy

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Skład

Xenna Fast zawiera dejonizowany koncentrat moczku winogronowego; sorbitol; wodę; wyciąg z malwy, żel aloesowy; płynny wyciąg z prawoślazu; hydroglicerynowy wyciąg z propolisu.

Dawkowanie

Xenna Fast jest produktem, który stosuje się doodbytniczo. Mikrowlewkę są dokładnie zamknięte w szczelnym, gotowym do użycia

opakowaniu, w celu ułatwienia ich użycia oraz zapewnienia higieny z tym związanej. Używając Xenna Fast należy wyjąć jedną mikrowlewkę, zdjąć osłonkę z pojemnika, posmarować aplikator kroplą roztworu i wprowadzić do odbytu. Następnie wyciska się cały roztwór z pojemnika. Wyjmując aplikator z odbytu należy cały czas trzymać pojemnik ściśnięty.

Należy stosować jedną mikrowlewkę w przypadku zaparc. Jeśli zaparcia są uciążliwe, po zastosowaniu jednej mikrowlewki, po 10 minutach należy wprowadzić kolejną.

Przeciwwskazania

Mikrowlewką Xenna Fast nie powinna być stosowana u osób z nadwrażliwością lub uczulonych na jeden ze składników produktu.